

Mission:

To protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county & community efforts.



Vision: To be the Healthiest State in the Nation

Rick Scott
Governor

John H. Armstrong, MD, FACS
State Surgeon General & Secretary

23 de febrero 2015

Estimado padre o tutor:

En los últimos meses, el sarampión ha sido reportado entre los viajeros que visitaron la Florida. Todos tenían ya sea un desconocido o sin antecedentes de vacunación contra el sarampión. Si bien no hay casos confirmados de sarampión entre los residentes de Florida en este momento, las personas que pueden haber estado expuestas a los viajeros infectados están siendo notificados y asesorados.

Esta carta tiene por objeto informarle acerca de la enfermedad del sarampión; pasos a seguir para proteger a su hijo y otras personas se infecten con el sarampión; y lo que ocurriría si un caso se identificó en la escuela de su hijo.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente a través del aire al respirar, toser o estornudar. Casi todas las personas que no han tenido el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) obtendrán el sarampión si están expuestos. Síntomas de sarampión generalmente comienzan aproximadamente de siete a 14 días después de que una persona está expuesta a alguien con sarampión, pero puede tomar hasta 21 días a partir de la exposición para que los síntomas comiencen. Los síntomas incluyen: fiebre, erupciones, tos, secreción nasal y los ojos, y la fatiga. La erupción comienza generalmente en el rostro de una persona en la línea del cabello y se extiende hacia abajo. El sarampión puede transmitirse a otros ya en cuatro días antes de la erupción se hace visible a cuatro días después de que aparezca la erupción. Alrededor de tres de cada 10 personas que contraen el sarampión desarrollarán una o más complicaciones, como la neumonía, infecciones de oído o diarrea.

El virus del sarampión puede sobrevivir por hasta dos horas en superficies o en un espacio aéreo en que la persona infectada tose o estornuda. La transmisión del sarampión a personas no vacunadas puede ocurrir incluso después de que la persona infectada ha salido de la habitación.

Si le preocupa que su hijo puede haberse infectado y está mostrando síntomas de sarampión-como debe comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato. En un esfuerzo por evitar la propagación de la enfermedad a otros, asegúrese de que su hijo:

- lleva una máscara en la búsqueda de asistencia médica si él o ella tiene una erupción o la tos. Si es posible, llame con anticipación para organizar una sala de espera separada, lejos de otros pacientes
- Evita tocar su ojos, la nariz y la boca
- Se lava las manos frecuentemente con agua y jabón
- Cubre su boca cuando él o ella tose o estornuda
- Estancias en casa y evite el contacto con los demás
- Está al día con las vacunas

La vacuna MMR es la mejor manera de protegerse contra el sarampión. Los que están totalmente inmunizados tienen muy poco riesgo de desarrollar el sarampión. Lo ideal es que los niños deben recibir dos dosis, la primera dosis a los 12 a 15 meses de edad, y la segunda dosis a los cuatro y seis años de edad. Sin embargo, los niños y adultos que no han recibido las vacunas MMR en el pasado

Florida Department of Health in Pasco County

Michael J. Napier, Administrator, Health Officer
10841 Little Road, New Port Richey, Florida 34654
PHONE: 727/861-5250 • FAX 727/862-4230

www.FloridaHealth.gov

TWITTER: HealthyFLA
FACEBOOK: FLDepartmentofHealth
YOUTUBE: fldoh
FLICKR: HealthyFla
PINTEREST: HealthyFla

también pueden optar por recibir la vacuna. La información relativa a las vacunas para adultos y vacunas para los niños está disponible a través de la oficina de su médico o la clínica del departamento de salud local.

El Departamento de Salud de Florida trabajará en estrecha colaboración con su distrito escolar si un caso de sarampión se identifica dentro de la población escolar. El foco de este esfuerzo será para limitar cualquier exposición potencial dentro de la comunidad escolar. Los padres de los estudiantes sin documentación de vacunas requeridas deben ser conscientes de que un caso de sarampión en la escuela de su niño requerirá a todos los niños sin prueba documentada de la vacunación o inmunidad al sarampión que ser excluidos inmediatamente de asistir a la escuela por un mínimo de 21 días desde el momento de exposición o casos más largo debe adicionales ocurren. Esta autoridad concedida en la sección §1003.22, Estatutos de la Florida encontrar en http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=1000-1099/1003/Sections/1003.22.html.

Si usted tiene alguna pregunta sobre la información anterior, por favor visite www.cdc.gov/measles/index.html o comuníquese con la enfermera de la escuela, el supervisor de la salud en la oficina del distrito escolar Lisa Kern en (813) 794-2360, o la Departamento de Salud - Condado de Pasco al (352) 521-1450 opción 1.

Gracias por sus esfuerzos para proteger a su hijo y otros niños en la comunidad de sarampión usted.

Atentamente,



Michael J. Napier
Health Officer, Pasco County
Florida Department of Health

Sincerely,



Kurt S. Browning
Superintendent of Schools
Pasco County

**Department of Health – Pasco County
Locations for MMR Vaccine**

Please call ahead.

New Port Richey - Main Office
10841 Little Road
New Port Richey, FL 34654
(727) 861-5260

Dade City
13941 15th Street
Dade City, FL 33525
(352) 521-1450

Land O' Lakes
4135 Land O'Lakes Boulevard
Land O'Lakes, FL 34639
(813) 558-5173

Zephyrhills
4717 Airport Road
Zephyrhills, FL 33542
(813) 780 - 0740